DİYABET
ve EŞLİK EDEN HASTALIKLAR
TEDAVİ KONGRESİ

30 Ekim - 02 Kasım 2025 / Gaziantep

Shimall Deluxe Otel & Kongre Merkezi



KONGRE
BİLDİRİ KİTABI

P-02

Tip 2 Diyabette Ölümle Sonuçlanan Bir Mukormikoz Vakası

Esma Dündar, Rojda Kotan, Bahri Evren

İnönü Üniversitesi

Amaç: Mukormikoz özellikle diyabet hastaları ve immun suprase hastalarda görülen ve mortal seyirli nadir bir mantar enfeksiyonudur. Tanının gecikmesi halinde ölümle sonuçlanabilmektedir. Vakamızdan yola çıkarak kontrolsüz diyabet hastalarında mukormikozun mutlaka göz önünde bulundurulup tanı ve tedavisinin ivedilikle gerçekleştirilmesi gerektiğini vurgulamayı amaçladık.

Olgu: 39 yaş erkek hasta sağ gözünde şişme ve görme kaybı nedeniyle acil servise başvurdu. Bilinen 3 yıldır tip 2 diyabetes mellitusu vardı ve ilaçlarını kullanmıyordu. 1 hafta önce kulak burun boğaz (KBB) poliklinik muayenesinde sinüzit tanısı almış ancak başlanan tedaviye rağmen yüzündeki şişlik artmış. Acil serviste yapılan tetkiklerinde glukoz: 515 mg/dl PH:7,2 HCO3: 12 mmol/L İdrar ketonu +3 Hba1c: %14 olarak sonuçlanan hasta ketoasidoz olarak değerlendirilerek endokrinoloji adına dahili yoğun bakıma interne edildi, insülin infüzyon tedavisi ve hidrasyon başlandı. Göz hastalıkları ve KBB ile konsülte edildi, orbital selülit olarak değerlendirilerek antibiyoterapisi başlandı. Yatışının ikinci gününde ketoasidoz tablosu devam eden, akut faz reaktanları yükselme eğilinde olan hastanın yüzünün sağ yarısında ekimoz ve oral mukozada nekrotik koyu renkli alan gelişmesi üzerine mukormikoz olabileceği şüphesiyle KBB ile konsülte edildi. Paranasal tomografi çekildi ve burundan frozen patoloji gönderildi. Patoloji ve paranasal tomografi sonuçları mukormikozis ile uyumlu olan hasta yatışının üçüncü gününde arrest oldu ve müdahale sonucunda entübe edildi. KBB ile operasyon açısından konsülte edildi ancak genel durumu uygun görülmedi, enfeksiyon hastalıkları ile konsülte edilerek amfoterisin-B 10mg/kg ıv tedavisi başlandı. Yatışının beşinci gününde hasta tekrar arrest oldu ve müdahale sonucunda eksitus olarak kabul edildi.

Sonuç: Mortal sonuçlanan kontrolsüz diyabeti olan mukormikoz vakamız; özellikle kontrolsüz diyabet hastalarında ve immun sıuprase hastalarda nasal, orbital enfeksiyon belirtileri varlığında mutlaka öncelikle mukormikoz ekartasyonunun sağlanması ve ivedilikle cerrahi ve medikal tedavi planlanması gerektiğini vurgulamaktadır.

Anahtar Kelimeler: mukormikoz, diyabet, sinüzit